

CLOFURVET® 20%



CLORTETRACICLINA 20% - POLVO ORAL GRANULADO

Código

230990

Composición

Cada 100 g de producto contienen:
Clortetraciclina (como complejo calcio) 20,0 g
Excipientes c.s.p. 100 g

Especie de destino

Aves, bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Indicaciones de uso

Bovinos: Enteritis bacteriana causada por *E. coli* y *Salmonella spp.*, Neumonía por Complejo Respiratorio Bovino (*Pasteurella spp.* y *Haemophilus spp.*). Reducción incidencia de abortos por *Campylobacter fetus*. Control infección activa por *Anaplasma marginale*.

Ovinos: Enteritis causadas por *E. coli*. Neumonías por *Pasteurella multocida*.

Pollos Broiler: Enteritis causadas por *E. coli*. Prevención Cólera Aviar por *Pasteurella multocida* sensible. Enfermedad respiratoria incluyendo Enfermedad de Sacos Aéreos por *Mycoplasma gallisepticum* y *E. coli*. Enfermedad respiratoria crónica por organismo susceptibles. Control de Sinovitis por *Mycoplasma synoviae*.

Pavos: control de enteritis causada por organismos susceptibles. Paratífus (*Salmonella typhimurium*). Control de synovitis por *Mycoplasma synoviae*.

Cerdos: control de enteritis bacteriana causada por *E. coli* y *Salmonella spp.* Leptospirosis. Neumonía causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella spp* y *Klebsiella spp.* Abscesos cervicales por bacterias susceptibles.

Vía de administración y dosis

Vía oral, mezclado en el alimento.

Aves y cerdos: 300 – 400g de Clortetraciclina/ton alimento (equivalente a 1.500 a 2.000 g de CLOFURVET® 20%/ton alimento). Repetir cada 24 horas durante 5 – 7 días. En cerdos hasta 14 días

Temeros, corderos y cabritos: 600g de Clortetraciclina/ton alimento (equivalente a 1.500 a 3.000 g de CLOFURVET® 20%/ton alimento). Repetir cada 24 horas durante 5 – 7 días.

Bovinos: 350g/animal/día (equivalente a 1750 g de CLOFURVET® 20%/ton alimento). Repetir cada 24 horas durante 5 – 7 días.

Advertencia y Precauciones

CLOFURVET® 20% debe ser mezclado de forma cuidadosa con el alimento. Durante el tratamiento, se recomienda que el alimento sea administrado de forma única y ad libitum. Evitar contacto con piel, ojos y vestimenta. Al manipular el producto utilizar gafas, mascarilla y guantes. Lavar bien las manos después de la manipulación. Cualquier problema causado por el manejo del producto, recurrir a la atención médica inmediatamente.

Contraindicaciones, Efectos Colaterales y Restricciones de uso

Alteración del tracto gastrointestinal después de la administración oral. En bovinos puede existir disfunción o atonía ruminal.

Puede ser administrado durante preñez y lactancia, pero cerdos nacidos después del tratamiento, pueden presentar dientes y huesos con coloración amarillentas.

Reacciones adversas

Reacciones de hipersensibilidad son de rara incidencia, como reacciones de anafilaxis y fotosensibilización.

Periodo de retiro

Carne: 7 días.

No administrar en vacas de producción de leche ni a gallinas ponedoras cuyos huevos estén destinados al consumo humano.

Almacenamiento

Mantener en lugar seco a menos de 30° C, protegido de la luz, en su envase rotulado y bien cerrado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentaciones

Bolsas 25kg.

Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

Fabricado por:

Pucheng Chia Tai Biochemistry CO. LTD.

Importado y Distribuido por:

Veterquímica Perú S.A.C.

Av. Huarochirí Mz E – Lote 20 Urb. Santa Raquel - Ate - Lima

USO VETERINARIO
REG SENASA N° F.82.81.I.0154