

QUIFLUMIL® 10%



ENROFLOXACINO 10% - SOLUCIÓN ORAL

Código

409501

Composición

Cada 100mL de solución contienen:

Enrofloxacino	10,0 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

Especie de destino

Pollos, pavos, ponedoras (crianza y recría), bovinos y porcinos.

Indicaciones de uso

Tratamiento de cuadros infecciosos respiratorios, digestivos, reproductivos y articulares producidos por microorganismos sensibles a la enrofloxacino.

Vía de administración y dosis

Por vía oral, disuelto en el agua de bebida.

Bovinos y cerdos: en cuadros moderados utilizar 2,5mg/kg PV/día, durante 3 días, en cuadros severos utilizar la dosis de 5mg/kg PV/día, en cuadros severos.**Pavos, Pollos y ponedoras en crianza y recría:** 10mg/kg PV/día durante 5 días. En enfermedad respiratoria crónica, administrar 10mg/kg PV/día, durante 10 días.

Modo de preparación

Adicionar la cantidad de **QUFLUMIL® 10%** según la cantidad de animales a tratar y disolver en una fracción de agua a administrar, luego completar el total de volumen calculado. Este volumen deberá corresponder a un tercio (1/3) de total del consumo diario de agua estimado según edad, peso y condición climática. Suspender la administración de agua mediante bebederos automáticos, mientras dure la administración de **QUIFLUMIL® 10%**. La preparación y administración de **QUIFLUMIL® 10%** deberá realizarse en bebederos destinados únicamente para el tratamiento de los animales enfermos.Se recomienda suspender el consumo de agua un par de horas antes de administrar **QUFLUMIL® 10%** disuelto.**QUIFLUMIL®** deberá ser administrado en una sola toma diaria. No reutilizar restos de la solución preparada.

Preparar las soluciones diariamente. La solución deberá ser preparada bajo supervisión del médico veterinario.

Almacenamiento

Mantener a temperatura ambiente (15 – 30° C) en lugar seco, protegido de la luz, en su envase original, debidamente rotulado y bien cerrado.

Precauciones de uso

Podría generar alteraciones en el cartílago de crecimiento en animales en desarrollo. En ponedoras en crianza y recría administrar solo hasta 14 días antes del inicio de la postura.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Precauciones para el operador

Durante la manipulación del producto, evitar la inhalación y el contacto directo con la piel y ojos. Utilizar guantes y gafas protectoras.

Periodo de resguardo

Carne: bovinos (14 días), cerdo (10 días), pavo (8 días), pollo (8 días).

Leche: no administrar a animales cuya leche se destine al consumo humano.

No administrar a ponedoras en producción cuyos huevos se destinen para consumo humano.

Presentaciones

Frasco 100 ml, 250ml, 500ml, 1L, 2L, 5L, 10L

Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

Fabricado por:

VETERQUIMICA S.A.

Importado y Distribuido por:

Veterquímica Perú S.A.C.

Av. Huarochirí Mz E – Lote 20 Urb. Santa Raquel - Ate - Lima

USO VETERINARIO
REG SENASA N° F.03.32.I.1543