

FLOXINOLONA[®] 20%



ENROFLOXACINA 20% - SOLUCIÓN INYECTABLE

Código

402168

Composición

Cada 1ml de producto contienen:

Enrofloxacino	200 mg
Excipientes c.s.p.	1mL

Especie de destino

Porcinos

Indicaciones de uso

Indicado para el tratamiento de patologías respiratorias asociadas a *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

Vía de administración y dosis

Por vía intramuscular profunda.

Dosis única de 7,5mg de enrofloxacina/kg de PV (equivalente a 1,5ml de FLOXINOLONA 20% / 40kg de PV)

Inyectar asépticamente usando jeringa estéril.

Advertencias, precauciones especiales de uso y reacciones adversas

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Mantener un buen nivel de hidratación de los animales durante el tratamiento. La administración en animales en desarrollo podría generar alteraciones en el cartílago articular. No administrar más de 10mL de producto por sitio de inyección. El uso de fluoroquinolonas debe ser reservado para el tratamiento de aquellos casos clínicos que hayan respondido de forma escasa o se espera que no respondan, a otra clase de antimicrobianos. Siempre que sea posible las fluorquinolonas deben ser usadas después de realizar un test de sensibilidad antimicrobiana. El uso del producto en condiciones distintas a las recomendadas, puede incrementar la prevalencia de bacterias resistentes a las fluoroquinolonas y disminuir la eficacia del tratamiento con otras quinolonas debido a las resistencias cruzadas. En cerdos tratados con hasta cinco veces la dosis terapéutica, no se observaron efectos adversos. Podría causar cristaluria.

Contraindicaciones

No administrar a animales con nefropatías y/o hepatopatías. No administrar a animales con hipersensibilidad a las quinolonas. No administrar a hembras en periodo de gestación, lactancia, ni animales reproductores.

Precauciones para el operador

Durante la manipulación del producto, evitar el contacto directo con piel y ojos, mediante el uso de elementos de protección como guantes, mascarilla y ropa de seguridad. No fumar ni beber durante la administración del producto. Lavarse las manos con agua y jabón después de aplicar el producto. En caso de contacto con los ojos y/o piel lave inmediatamente con abundante agua. En caso de autoinyección accidental, consultar con un médico inmediatamente.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o material de desecho

Envases vacíos pueden ser descartados como residuos domésticos, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para los restos del producto o productos vencidos, contactar a empresa fabricante para recibir recomendaciones de una correcta eliminación.

Periodo de resguardo

Carne: 15 días

Almacenamiento

Mantener a temperatura ambiente (15 - 30° C), en ambiente seco, protegido de la luz, en su envase original debidamente rotulado y bien cerrado. Una vez abierto, utilizar el producto dentro de 30 días. Luego de este periodo descartar el producto sobrante.

Presentaciones

Frasco 100ml, 250ml, 50ml (cajas 6 unidades)

Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

Fabricado por:

VETERQUIMICA SA

Importado y Distribuido por:

Veterquímica Perú S.A.C.

Av. Huarochirí Mz E – Lote 20 Urb. Santa Raquel - Ate - Lima

USO VETERINARIO
REG SENASA N° F.82.01.I.0317