

TERCIDON®



SUSPENSIÓN INYECTABLE

Código

409914

Composición

Cada 1mL g de producto contienen:

Penicilina G Procaina	125 000 UI
Penicilina G Benzatina	125 000 UI
Dihidroestreptomicina (como sulfato)	0.16 g
Excipientes c.s.p.	1 mL

Especie de destino

Bovinos, cerdos, ovinos, equinos, perros y gatos.

Indicaciones

Se indica su uso en infecciones del tracto urinario, Sistema respiratorio (neumonía, tonsillitis), abscesos, metritis y leptospirosis.

Vía de administración y dosis

Se administra por vía intramuscular 1mL cada 10kg de peso corporal, lo que corresponde a 16mg/kg de dihidroestreptomicina y 25.000 UI/kg de penicilina G, cada 48 horas o según el criterio del médico veterinario.

Advertencia

Pueden producir reacciones de hipersensibilidad que pueden cursar con fiebre, inflamación, color y shock anafiláctico.

Dosis altas o tratamiento prolongado de estreptomicina puede provocar ototoxicidad, neurotoxicidad y nefrotoxicidad.

No administrar a animales con afecciones renales severas. No administrar simultáneamente con tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos y lincosamidas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Período de resguardo

Carne: 30 días

Leche: No administrar a animales cuya leche se destine a consumo humano.

Almacenamiento

Conservar en su envase original, refrigerado entre 2° y 8°C, debidamente rotulado y bien cerrado.

Presentaciones

Frascos 20ml, 40ml, 50ml y 100ml.

Condición de venta

Venta bajo receta médico-veterinaria.

Fabricado y distribuido por:

Hebei Yuanzheng Pharmaceutical Co. Ltd.

Importado y Distribuido por:

Veterquímica Perú S.A.C.

Av. Huarochirí Mz E – Lote 20 Urb. Santa Raquel - Ate – Lima

USO VETERINARIO
REG SENASA N° F.03.01.I.296